


# DESTAsept® DERM pro

## Hautdesinfektionsmittel, farblos

Zur Hautdesinfektion  
und für Kühlumschläge  
2-Propanol 70 % (V/V) Lösung



### Anwendungsgebiete:

Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, Desinfektion talgdrüsenreicher Haut, Kühlumschläge.

### Eigenschaften:

Frei von Zusatzstoffen  
Sporenfrei gefiltert  
DGHM/ VAH gelistet

### Anwendung und Einwirkzeit:

Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße	Haut sorgfältig mit der Lösung einreiben, 15 Sekunden feucht halten
Hautdesinfektion vor Operationen, Punktionen von Gelenken, talgdrüsenarmer Haut	Haut sorgfältig mit der Lösung einreiben, 1 Min. feucht halten
Desinfektion talgdrüsenreicher Haut	Haut sorgfältig mit der Lösung einreiben, 10 Min. feucht halten
Kühlumschläge	Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anwenden

### Mikrobiologische Wirksamkeit:

Bakterizid (inkl. MRSA)  
Levurozid  
Begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia-Viren), Rota-Viren inaktivierend

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. DGHM / VAH	Konz. 15 Sek.
Wirksam gegen alle behüllten Viren inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Influenza-Viren	Konz. 15 Sek.
Rota-Viren	Konz. 15 Sek.

### Zusammensetzung:

In 100g sind enthalten: Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1g; sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser.

### Auf einen Blick:

- ✓ Geprüft nach DGHM-Richtlinien
- ✓ Begrenzt viruzid gem. RKI Empfehlung
- ✓ Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid

**VAH**  
gelistet



Auf Pfuhlst 1  
D-66589 Merchweiler  
+49 (0)6825 - 8019956

# DESTAsept® DERM pro

## Hautdesinfektionsmittel, farblos

### Gegenanzeigen:

DESTAsept® DERM pro Hautdesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

**Nebenwirkungen:** Beim Einreiben der Haut mit DESTAsept® DERM pro können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Bei Auftreten von nicht aufgeführten Nebenwirkungen informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Hinweise:

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzungen der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. DESTAsept® DERM pro Hautdesinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

### Warnhinweise:

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Zul.-Nr. 1599.98.99

### Gutachten

#### PD Dr. med. F.-A. Pitten, Gießen:

Gutachten zur Hände- und Hautdesinfektion gem. DGHM-/VAH-Richtlinien.

#### Prof. Dr. med. habil. Kramer, Greifswald:

Gutachten zur Hautdesinfektion gem. DGHM-/VAH-Richtlinien.

#### Dr. Steinmann, Bremen:

Gutachten zur Wirksamkeit gegen BVDV und Vaccinia-Virus nach RKI/DVW Leitlinie.

DESTAsept® DERM pro – Gebindegrößen und Zubehör		
Artikel	Art.-Nr.	PZN
250 ml Flasche	4880051	10088823
1000 ml Flasche	4880052	10088846
5 L Kanister	4880053	10088852
Dosierpumpe 20 ml für 5 L Kanister	4862064	
Dosierpumpe 30 ml für 5 L Kanister	4862065	
Auslaufhahn für 5 L Kanister	4862058	
Kanisterschlüssel für 5 L Kanister	4862059	