

ALCODERM®

Aldehyd- und phenolfreie Hautdesinfektion

- ✓ Wirkungsgrad von 99,999 %
- ✓ VAH - zertifiziert
- ✓ wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid (inkl. M.terrae)
- ✓ biologisch gut abbaubar
- ✓ farblos
- ✓ vor Injektionen und für Kühlumschläge
- ✓ begrenzt viruzid und ist damit umfassend wirksam gegen alle behüllten Viren (BVDV/Vaccinia inkl. HBV, HIV, HCV)
- ✓ **wirksam gegen unbehüllte Viren (Rota- und Noroviren)**
- ✓ **wirksam gegen Bakterien (MRSA)**
- ✓ Zugelassen in der BRD: Zul.-Nr. 1599.98.99 (Arzneimittel)

Einwirkzeit: 30 Sekunden



HAUTDESINFEKTION

REF	Artikel	Karton	Europalette
00985D	250 ml Flasche	12 x 250 ml	120 Karton
00986	1 l Flasche	10 x 1 l	48 Karton

Zubehör:

REF	Artikel
00930	Dosierpumpe 1 l

ALCODERM[®]

Zusammensetzung:

100g Lösung enthalten: 2-Propanol 63,1 g; gereinigtes Wasser 36,9 g

Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise:

Nur äußerlich anwenden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Leicht entzündlich. Behälter dicht verschlossen halten. Nicht in die Augen bringen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden!

Anwendung:

Desinfektion der Haut vor Injektionen; hygienische Händedesinfektion; Kühllumschläge

Dosierung:

Soweit nicht anders verordnet, zur Desinfektion die betroffene Hautstelle mit ALCODERM[®] abreiben und trocknen lassen. Zur hygienischen Händedesinfektion 3-5 ml Lösung in den Händen verreiben. Für Kühllumschläge ALCODERM[®] mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anwenden.

Hinweis: ALCODERM[®] wirkt nicht sporentötend.

Hautantiseptik:

Talgdrüsenarme Haut vor Injektionen und Punktionen: 15 Sek.

Vor Punktionen von Gelenken, Körperhöhlen und Hohlorganen, sowie operativen Eingriffen 30 Sek.

Talgdrüsenreiche Haut 10 Min.

Gegenanzeigen:

ALCODERM[®] ist nicht zur Desinfektion offener Wunden anzuwenden.

Begutachtung:

Prof. Dr. med. B. Wille, Gießen; Fachhygienisches Gutachten zur Eignung von Alcoderm als Hautdesinfektionsmittel vom 28.08.1997;

Prof. Dr. med. A. Kramer, Greifswald; Gutachten über die Prüfung von ALCODERM[®] im praxisnahen Hauttest vom 09.09.1997

Wirksam gegen:

- alle behüllten Viren:
(z.B. BVDV/Vaccinia inkl. HBV, HIV, HCV)
- unbehüllte Viren:
(z.B. Rotavirus, Norovirus)