

Fresubin® Clear Thickener



Produkteigenschaften

- Amylaseresistentes Andickungspulver zur sicheren Ernährung bei Schluckstörungen
- Klares Aussehen
- Schnelles und dauerhaftes Andicken
- Einfache Zubereitung
- Angenehmes Mundgefühl
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Mit Ballaststoffen
- Laktosefrei
- Glutenfrei

Indikationen

- Schluckstörungen, z. B. bei
 - neurologischen Erkrankungen (Schlaganfall, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose)
 - onkologischen Erkrankungen

Dosierung/Anwendung

100 ml Flüssigkeit:
nektarartig 1 gestrichener ML, honigartig 3 gestrichene ML,
puddingartig 6 gestrichene ML



*

Kontraindikationen

Nicht geeignet bei grundsätzlicher Kontraindikation der enteralen Ernährung, wie z. B. Darmatonie, Ileus, akuten gastrointestinalen Blutungen. Nicht geeignet bei schwerer Malassimilation. Nicht geeignet bei angeborenen Stoffwechseldefekten bzw. Intoleranz gegen einen in Fresubin® Clear Thickener enthaltenen Inhaltsstoff.

Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren.

Bestellinformationen

Handelsform		Geschmack	Artikel-Nr.	PZN
Dose	1 x 150 g	Neutral	7930401	10998726
Dose	12 x 150 g	Neutral	793040A	11057776

* Rezepturierung auf grünem Rezept/Privatrezept

Nährstoffinformationen

	pro Messlöffel (1,75 g):	pro 100 g:
Energie	19,4 kJ (= 4,6 kcal)	1108 kJ (= 264 kcal)
Fett (0 Energie%)	0 g	0 g
davon gesättigte Fettsäuren	0 g	0 g
Kohlenhydrate (62,9 Energie%)	0,7 g	41,5 g
davon Zucker	0,02 g	1,3 g
davon Laktose	0 g	0 g
Ballaststoffe (36,4 Energie%)	0,8 g	48,0 g
Eiweiß (0,7 Energie%)	0 g	0,5 g
Mineralstoffe und Spurenelemente*		
Natrium	27 mg	1570 mg
Kalium	8,8 mg	500 mg
Phosphor	3,5 mg	200 mg

* Andere Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine sind in klinisch nicht relevanten Mengen enthalten.

Zutaten

Modifizierte Stärke, Xanthan, Maltodextrin, modifizierte Cellulose, Aroma.

Gebrauchsanleitung

1. Benötigte Pulvermenge in ein sauberes und trockenes Behältnis geben. 2. Die gesamte Flüssigkeit zügig zugeben. 3. Das Pulver 20 Sekunden lang mit einem Löffel sorgfältig und langsam (Vermeidung von Blasenbildung) durch Rühren in verschiedene Richtungen mischen. 4. Um die max. Andickung zu erreichen, das Produkt 1 Minute stehenlassen. Zubereitete Flüssigkeiten oder Speisen zeitnah verwenden. Heiße Getränke vor dem Andicken auf < 70 °C abkühlen. Kohlensäurehaltige Getränke vor dem Andicken solange rühren oder schütteln bis die Kohlensäure entwichen ist. Zum Andicken von pürierten Speisen die gewünschte Menge Fresubin® Clear Thickener beimischen und gut verrühren. Zum Herstellen einer Einweichlösung (z.B. für Brot, Kuchen) 1 ML Fresubin® Clear Thickener in 125 ml Flüssigkeit auflösen.

Stand April 2015