

# Freka<sup>®</sup> -DERM farblos/gefärbt

alkoholisches Hautdesinfektionsmittel

- ✓ kurze Einwirkzeit
- ✓ sporefrei gefiltert
- ✓ RKI-gelistet

- besonders hautverträglich
- kurze Einwirkzeit
- sporefrei gefiltert
- farblos oder gefärbt erhältlich



## PRÄPARATETYP

Gebrauchsfertiges alkoholisches Hautdesinfektionsmittel. **Freka<sup>®</sup>-DERM farblos/gefärbt** ist aufgrund seiner anwenderfreundlichen Wirkstoffkombination in der Lage, ein umfassendes Wirkungsspektrum bei gleichzeitiger Hautverträglichkeit zu erreichen.

## ANWENDUNGSGEBIETE

**Freka<sup>®</sup>-DERM farblos/gefärbt** wird zur prä- und postoperativen Hautdesinfektion, vor Punktionen sowie vor kleinen medizinischen Eingriffen eingesetzt.

**Freka<sup>®</sup>-DERM gefärbt** ist zur besseren Markierung des Desinfektionsfeldes rot eingefärbt.

## ANWENDUNG

Die zu desinfizierende Haut mit der unverdünnten Lösung besprühen oder betupfen.

## WIRKUNGSSPEKTRUM

**Freka<sup>®</sup>-DERM farblos/gefärbt** wirkt:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- fungizid
- virusinaktivierend (HIV/HTLV/Polio-Viren)

Ergebnisse aus in-vitro-Versuchen gegen BVDV und Vaccinia-virus lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis-B-Virus, HI-Virus.

## EINWIRKZEITEN

**Hautdesinfektion vor Injektionen oder Punktionen etc.**

Körperoberfläche gleichmäßig und ausreichend besprühen oder mit sterilem getränkten Tupfer einreiben.

konz. - 15 Sek.

**Präoperative Hautantiseptik**

Das OP-Gebiet mit einem getränkten Steril-Tupfer gleichmäßig satt benetzen. Den Vorgang wiederholen.

konz. - 1 Min.

**Antiseptik talgdrüsenreicher Haut**

virusinaktivierend HIV / HTLV

Polio-Virus

konz. - 10 Min.

konz. - 1 Min.

konz. - 2 Min.

## ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g der gebrauchsfertigen Lösung sind enthalten:

**Arzneilich wirksame Bestandteile:**

Ethanol 80 g

Benzalkoniumchlorid 0,1 g

Biphenyl-2-ol 0,025 g

Chlorofen 0,025 g

**Sonstige Bestandteile:**

Gereinigtes Wasser, Citronensäure, Natriumhydroxid.

**Freka<sup>®</sup>-DERM gefärbt** enthält zusätzlich die Farbstoffe

E104, E110, E151.



VERTRIEB DURCH:  
**DR. SCHUMACHER GMBH**  
Postfach 11 62 D-34201 Melsungen  
Telefon +49/5664/9496-0

WWW.SCHUMACHER-ONLINE.COM

# **Freka<sup>®</sup> -DERM farblos/gefärbt**

*alkoholisches Hautdesinfektionsmittel*

## LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufeinheit	PZN	Art.-Nr.
<b>farblos</b>			
250 ml Sprühflasche	3 x 250 ml	4775726	FR-503-0025-03
250 ml Sprühflasche	30 x 250 ml	1534117	FR-503-0025
1 L Flasche	10 x 1 L	2151476	FR-503-010
<b>gefärbt</b>			
250 ml Sprühflasche	30 x 250 ml	1412727	FR-504-0025
1 L Flasche	10 x 1 L	2077337	FR-504-010

## BESONDERE HINWEISE

Alkohohlaltig, leichtentzündlich.  
Flammpunkt: < 21 °C. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
Elektrische Geräte erst nach Auftrocknung benutzen.  
Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen.  
Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.  
Ein Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen erfolgen (Sterilbank). Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

## NEBENWIRKUNGEN

Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Austrocknung) kommen. In diesem Fall sind die Hautschutzmaßnahmen zu verstärken. Auch Kontaktallergien sind möglich. Bei Auftreten von nicht aufgeführten Nebenwirkungen informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

## GEGENANZEIGEN

Nicht bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe anwenden. Nicht auf der Schleimhaut anwenden.  
Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit:  
Für die Anwendung während der Schwangerschaft liegen keine klinischen Daten über exponierte Schwangere vor. Das potentielle Risiko für den Menschen ist nicht bekannt.  
**Freka<sup>®</sup> -DERM farblos/gefärbt** ist in tierexperimentellen Studien nur unzureichend untersucht. Bei der Anwendung in der Schwangerschaft ist Vorsicht geboten.

Für die Anwendung von **Freka<sup>®</sup> -DERM farblos/gefärbt** während der Stillzeit liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Bei der Anwendung in der Stillzeit ist Vorsicht geboten. Die Anwendung bei Säuglingen darf nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen.

## GUTACHTEN

**Dr. Chr. Höller**, Hygieniker, Kiel:  
Gutachten zur Hautdesinfektion mit **Freka<sup>®</sup> -DERM farblos/gefärbt** nach DGHM-Richtlinien vom 13.02.2003.

**Prof. Dr. H.-P. Werner**, Krankenhaushygieniker, Bischofshofen:  
Gutachten zur Hautdesinfektion nach DGHM-Richtlinien vom 08.02.1994. Ergänzungsgutachten zur bakteriziden Wirksamkeit von **Freka<sup>®</sup> -DERM farblos/gefärbt** vom 22.10.2005.

**PD Dr. Flehmig**, Virologe, Tübingen:  
Gutachten zur HIV/HTLV Wirksamkeit vom 25.07.1985

**Prof. Dr. L. Döhner**, Greifswald:  
Gutachten zur Wirksamkeit von **Freka<sup>®</sup> -DERM farblos/gefärbt** gegen Polio-Viren vom 25.07.1994.

## ZULASSUNG / ZERTIFIZIERUNG

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der VAH.  
**Freka<sup>®</sup> -DERM farblos** ist eingetragen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des RKI.

Zugelassen nach AMG in der Bundesrepublik Deutschland.  
Zul.-Nr. 6666288.00.00 (**Freka<sup>®</sup> -DERM farblos**)  
Zul.-Nr. 6666265.00.00 (**Freka<sup>®</sup> -DERM gefärbt**)

